

geste et gestion

LE NOUVEAU PRATICIEN VÉTÉRINAIRE

HORS SÉRIE
2002

Hospitalisation
du chien
et du chat



astuces

- accueil et restitution des animaux
- fluidothérapie - inhalations
- oxygénothérapie - nettoyage des locaux
- alimentation - animaux agressifs, ...

La prise en charge de l'animal

- L'équipement
- La pharmacie de base
- Approche comportementale de l'animal hospitalisé
- Gestion thérapeutique de la douleur
- L'alimentation et conseils pratiques
- Les perfusions
- Définitions, facteurs de risque et prévention des infections nosocomiales
- Comment gérer le réveil postopératoire

Les gestes de base

Comment poser :

- un cathéter veineux
- un cathéter central
- une sonde urinaire à demeure
- les sondes de nutrition entérale
- un drain thoracique

Comment réaliser :

- une transfusion sanguine

Les situations particulières

Comment gérer :

- les troubles cardiaques
- l'insuffisance respiratoire
- le diabète
- l'insuffisance rénale
- les vomissements et la diarrhée aigus
- la mise bas et la dystocie
- les soins chez les chiots
- les plaies étendues
- le suivi et les soins

HORS-SÉRIE : L'HOSPITALISATION DU CHIEN ET DU CHAT

Concevoir une structure d'hospitalisation de qualité, c'est avant tout une réelle volonté de bien faire. La performance passe par l'attention que le praticien consacre à l'animal. Avec un matériel de base et quelques astuces, la technique devient accessible ...

Management et entreprise

- Architecture** - Conception et organisation du local d'hospitalisation
- Stratégie** - L'hospitalisation, facteur de développement de l'entreprise vétérinaire
- Marketing** - Facturer l'hospitalisation
- Calcul et maîtrise des coûts de l'hospitalisation**
- Fiche 1. Comment facturer ?
- Fiche 2. Matérialiser le service

Fiches ASV :

- La gestion des déchets
- Concevoir une feuille de soins
- Les tâches journalières de l'ASV
- L'entretien du matériel et des locaux

LE BIEN CONTRE LE MAL DE CHIEN



PUBLICIS ETOILE



RIMADYL INJECTABLE CONTRE LA DOULEUR APRES LA CHIRURGIE

Par son action périphérique et centrale ⁽¹⁾, le carprofène possède des effets analgésiques puissants comparables à ceux des morphiniques ⁽²⁾. RIMADYL injectable réduit la douleur et l'inflammation post-chirurgicales. Son injection en période pré-anesthésique permet l'obtention des effets analgésiques au réveil de l'animal, évitant les conséquences néfastes liées à la douleur post-chirurgicale. L'animal présente alors un réveil calme, confortable et une meilleure récupération après l'intervention.



RIMADYL® Injectable - Solution injectable pour chiens. COMPOSITION : 1 ml de la solution contient : Carprofène 50 mg, Alcool benzyle 10 mg, Excipient q.s.p 1 ml. INDICATIONS : chez le chien : réduction de la douleur et de l'inflammation post-chirurgicales. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : 4 mg de carprofène / kg (soit 0,8 ml / 10 kg), par injection intraveineuse ou sous cutanée. L'administration peut être réalisée en préopératoire (prémédication ou induction) ou à la fin de la chirurgie. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI : les ANS peuvent inhiber la phagocytose. En cas d'affection inflammatoire dans un contexte infectieux, une thérapie anti-microbienne adaptée doit être instaurée. Ne pas dépasser la dose ou la durée du traitement prescrites. CONTRE-INDICATIONS : ne pas utiliser chez les femelles en gestation et les chiots âgés de moins de 4 mois. Ne pas utiliser en cas d'affections hépatiques ou d'affections rénales sévères, d'ulcération ou saignement gastro-intestinal, de syndrome hémorragique et d'hypersensibilité aux ANS. UTILISATION EN CAS DE GRAVIDITÉ ET DE LACTATION : les études chez les animaux de laboratoire (rat, lapin) ont mis en évidence une foeto toxicité du carprofène à des doses proches de la dose utilisée en thérapeutique. L'innocuité de la spécialité chez la chienne pendant l'allaitement n'a pas été montrée. L'utilisation de la spécialité est déconseillée pendant l'allaitement et devra faire l'objet d'une évaluation du rapport bénéfice-risque par le vétérinaire. UTILISATION PENDANT LA GESTATION : cf. paragraphe « Contre-indications ». EFFETS INDESIRABLES : l'administration du médicament peut être à l'origine d'un léger ralentissement du rythme cardiaque en cours d'anesthésie. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : conserver entre +2°C et +8°C avant ouverture. Après ouverture, le flacon doit être conservé à une température inférieure à 25°C et être utilisé dans les 28 jours. CONDITIONS DE DELIVRANCE : liste I. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance. PRÉSENTATION : flacon de 20 ml - A.M.M. n° 677470.2 du 7/12/2001. FABRIQUE PAR : VERICOORE LIMITED, Kinross Road - Kingsway West, Dundee - Scotland DD2 3MR, Grande Bretagne. RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ : PFIZER, 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75014 PARIS. ©Marque déposée de PFIZER Inc. - ROS Evry B 542 059 746.