

Étiologie et démarche diagnostique

face à des pertes vulvaires chez une chienne

Les pertes vulvaires chez la chienne constituent un motif de consultation fréquent en clientèle vétérinaire. Ces pertes peuvent aussi être l'un des tous premiers signes que le praticien remarque au cours de l'inspection de l'appareil génital, lors de l'examen clinique.

Trop fréquemment, face à des pertes vulvaires, le vétérinaire établit d'abord les examens complémentaires à pratiquer en fonction des origines possibles des écoulements, alors qu'une démarche rigoureuse et standardisée peut l'aider à aboutir plus rapidement et plus sûrement à un diagnostic [1].

- Cet article présente la démarche diagnostique que nous enseignons depuis plusieurs années.

- Une chienne qui présente des pertes vulvaires attire souvent les mâles – sans doute en raison des odeurs qu'elle dégage –, même si elle n'est pas en chaleurs.

D'OÙ PEUVENT PROVENIR LES PERTES VULVAIRES ?

Avant d'aborder cette conduite diagnostique proprement dite, rappelons les situations cliniques à l'origine de pertes vulvaires chez la chienne.

Les pertes vulvaires d'origine utérine


Les pertes vulvaires d'origine utérine peuvent être consécutives à une action des œstrogènes sur l'utérus, à des saignements vulvaires non œstrogéno-dépendants, à une action de la progestérone sur l'utérus, à des pertes vulvaires d'origine infectieuse (encadré 1).

Les pertes vulvaires d'origine vaginale

Les pertes vulvaires d'origine vaginale peuvent être les vaginites et les tumeurs vaginales (encadré 2).

Les pertes vulvaires d'origine urinaire ou rénale

Une affection urinaire (ou plus rarement rénale) peut être accompagnée d'écoulements vulvaires. Il ne faut donc jamais



1 L'examen de la couleur de l'écouvillon servant à réaliser les frottis vaginaux permet de juger de l'aspect des pertes vulvaires (photo G. Casseleux).

oublier d'explorer cet appareil lors du diagnostic (encadré 3).

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

1. Vérifier si les pertes vulvaires sont liées à une imprégnation œstrogénique de l'organisme

- Les chaleurs sont la cause la plus fréquente de pertes vulvaires chez la chienne. Le plus souvent, une chienne en chaleurs présente des écoulements sanguins ou sérosanguins. Ils peuvent être :

- séreux si la chienne présente des chaleurs atypiques ou si elle est en œstrus, période au cours de laquelle les écoulements vulvaires deviennent souvent translucides ;
- muqueux, voire mucopurulents si la chienne est en fin de chaleurs, les écoulements vulvaires réaugmentent alors souvent et une vestibulite peut être présente ;
- foncés (marron-grisâtres, voire noirâtres en fin de chaleurs), à la transition entre la fin de l'œstrus et le début du métœstrus (photo 1).

- L'imprégnation œstrogénique de l'organisme engendre souvent des pertes vulvaires. Ceci peut par exemple être le cas lors :

- de chaleurs normales ou atypiques (encadré 4) ;
- d'affection ovarienne (kystes folliculaires, tumeurs) ;
- de rémanence ovarienne de la chienne castrée ;
- d'imprégnation iatrogène de l'organisme.

Aucune publication ni observation clinique ne permet, à ce jour, de penser que d'autres sources d'imprégnation œstrogénique (de type affection des surrénales, par exemple) peuvent entraîner des pertes vulvaires.

Alain Fontbonne

Service de reproduction animale

E.N.V.A.

7, avenue du Général De Gaulle

94704 Maisons-Alfort cedex

Objectif pédagogique

Connaître les causes de pertes vulvaires chez la chienne et la démarche diagnostique.

Essentiel

- Une chienne qui présente des pertes vulvaires attire souvent les mâles, même si elle n'est pas en chaleurs.

- Le frottis vaginal est le 1^{er} examen à pratiquer, quels que soient les commémoratifs et l'aspect des pertes vulvaires, que la vulve soit dilatée ou non.

- Si ce frottis indique une imprégnation œstrogénique, vérifier si les pertes vulvaires sont physiologiques ou si elles accompagnent un phénomène pathologique.

CANINE - FÉLINE