

la leishmaniose canine en France

une implantation grandissante

Le nombre de départements français concernés par l'enzootie canine de leishmaniose s'accroît.

Même si elle a été décrite en France dès 1913, la Leishmaniose canine est restée longtemps mal connue sur notre territoire, et les informations la concernant obtenues essentiellement à partir d'enquêtes épidémiologiques conduites autour de la problématique de l'endémicité humaine. Ainsi, à l'orée des années 1980, onze départements seulement étaient considérés comme endémiques (figure 1) et quelques "foyers" étaient mentionnés ailleurs.


Par la suite, diverses enquêtes ont été effectuées autour de la leishmaniose canine proprement dite, mais en général limitées à des régions ne permettant pas une vision d'ensemble simultanée. En outre, des méthodologies très variables étaient employées si bien que ces études ne sont pas réellement comparables entre elles.

QUATRE ENQUÊTES NATIONALES SUR LA LEISHMANIOSE CANINE EN FRANCE

- Nous avons conduit quatre enquêtes nationales sur la leishmaniose canine en France (en 1986, en 2004, en 2011 et en 2017) dont les trois dernières comparables [1, 2, 3, 4, 5] par l'envoi de questionnaires similaires à raison d'un seul par clinique vétérinaire (environ 5500 à 6500 selon les enquêtes) (figure 3). Dans ces questionnaires très détaillés (une soixantaine de questions fermées) figuraient des informations sur les caractéristiques de l'activité clinique, le nombre de cas annuels de chiens atteints de leishmaniose clinique (intervalles proposés), mais aussi cas considérés autochtones ou non, techniques diagnostiques utilisées, etc.

- Des taux de réponses très significatifs (17,9 p. cent, 23,2 p. cent, 11,5 p. cent, soit un total de 2880 questionnaires renseignés) et une couverture de l'ensemble du territoire du territoire permettent de considérer

Figure 1 - Carte récapitulative de la distribution et de l'évolution de la leishmaniose canine
(issue des dossiers d'enquêtes, original P. Bourdeau)



que les données collectées et les résultats obtenus ont une bonne représentativité.

Les informations recueillies traduisent la réalité "terrain" et l'impact de la "maladie" canine, les plus importants en pratique pour le vétérinaire. Cependant, ils ne permettent pas d'apprécier toute la circulation du parasite au sein de la population canine puisque les animaux infectés apparemment sains (soit la plupart) ne sont ni consultés ni dépistés.

Patrick Bourdeau

Unité DPM
École Nationale Vétérinaire,
Agroalimentaire et de l'Alimentation
Nantes Atlantique - Oniris
BP 40706, 44307 Nantes cedex 3.

Objectif pédagogique

Connaître les principales tendances des dernières enquêtes sur la leishmaniose canine en France.

Essentiel

Si le nombre global de cas cliniques a peu évolué ou même diminué, la leishmaniose canine est cependant très "active" en périphérie de sa zone de distribution et de nouveaux territoires et départements sont concernés.

CANINE - FÉLINE

Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article