

les affections qui interfèrent avec l'accouplement chez la chienne reproductrice

Anne Gogny

Reproduction des animaux de compagnie, Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire, École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes Atlantique - Oniris CS 40706, 44307 Nantes cedex 3

Chez la chienne, certaines affections de la vulve, du vagin ou du périnée peuvent empêcher l'accouplement et retentir indirectement sur le bon déroulement de la reproduction.

Chez la chienne, certaines affections de la vulve, du vagin ou du périnée occasionnent une gêne mécanique qui empêche l'accouplement ou apparaissent spécifiquement au moment des chaleurs. Elles peuvent donc retentir indirectement sur la fertilité de l'animal.


Cet article présente les principales affections du vagin, de la vulve et du périnée susceptibles d'interférer avec la conduite de la reproduction au moment de l'œstrus, chez la chienne : l'hyperplasie vaginale, le prolapsus vaginal, les anomalies congénitales du vagin et les anomalies de conformation du périnée.

L'HYPERPLASIE VAGINALE

- L'hyperplasie vaginale, ou ptose vaginale, se caractérise cliniquement par une hypertrophie de la muqueuse du vagin caudal (photo 1).
- Cette affection, sous dépendance des œstrogènes, apparaît au moment du pro-œstrus, le plus souvent chez des chiennes jeunes lors des premières chaleurs. Dans 10 p. cent des cas, elle concerne aussi des femelles gravides, au cours de la 2^e moitié de la gestation [3, 13].
- Une prédisposition raciale est rapportée chez les Boxers, les Bouledogues, les Mastiffs et les Dogues allemands, ce qui suggère une cause génétique [3, 9].

Les différents stades

- La maladie se manifeste par une protrusion de la muqueuse vaginale, classée en trois stades en fonction de son degré de développement.



1 Ptose vaginale de stade 2 : la muqueuse vaginale, en forme de poire (piriforme) présente une inflammation importante et des plaques nécrotiques (photos A. Gogny).



2 Ptose vaginale de stade 1 : la muqueuse vaginale est hypertrophiée et oedématisée, mais n'est pas apparente à l'extérieur des lèvres vulvaires.

- Dans le stade 1, l'hyperplasie concerne le plancher du vagin et n'émerge que dans la lumière de l'organe. Elle n'est donc pas apparente au niveau de la vulve (photo 2).

- Dans le stade 2, le plancher du vagin hypertrophié se présente comme une masse piriforme, visible à l'extérieur des lèvres vulvaires. Dans ce cas, le bulbe uré-

Objectif pédagogique

Reconnaître les principales affections de la vulve, du vagin et du périnée susceptibles d'interférer avec l'accouplement chez la chienne reproductrice.

Essentiel

- L'hyperplasie vaginale apparaît lors du pro-œstrus, le plus souvent chez des chiennes jeunes, au moment des premières chaleurs.
- Chez les chiennes entières, le taux de récurrence de l'hyperplasie vaginale lors des chaleurs suivantes est de 65 à 100 p. cent.
- Lors d'hyperplasie vaginale, l'administration de progestatifs par voie générale n'est pas recommandée, en raison du risque élevé de développement d'un pyomètre.
- Les anomalies congénitales du vagin sont généralement asymptomatiques.

CANINE - FÉLINE

Crédit Formation Continue : 0,05 CFC par article