

# chirurgie la périnéoplastie chez la chienne

**Anne Gogny**

Reproduction des animaux de compagnie, Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire, École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes Atlantique - Oniris CS 40706, 44307 Nantes cedex 3

La correction d'une vulve dite encapuchonnée consiste en une exérèse des tissus cutané et sous-cutané en excès, appelée périnéoplastie. Chez la chienne, une périnéoplastie est à envisager uniquement lorsque les troubles locaux sont réfractaires aux traitements, ou qu'ils deviennent chroniques.

Chez la chienne, le périnée forme parfois un repli cutané important, qui peut s'étendre ventralement jusqu'à recouvrir complètement la vulve. Cette anomalie de conformation est appelée "vulve encapuchonnée". Elle affecte surtout les femelles dont la peau comporte des replis marqués, telles que les Sharpei, les Mastiffs ou les Bouledogues, ou les races qui ont une prédisposition à l'embonpoint comme les Retrievers [4]. Chez les animaux qui présentent un embonpoint important, le repli est aggravé par l'accumulation de tissu adipeux en région périnéale.

Cet article présente les modalités de la prise en charge chirurgicale de l'animal et de l'intervention, ainsi que les complications potentielles les plus fréquentes.

## LES MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE

- En raison de la rétention locale des fluides émis, notamment de l'urine, ce repli cutané peut être à l'origine de vaginites, de cystites ou de troubles cutanés tels que des dermatites périvulvaires [1, 3, 4], qui engendrent

### NOTE

\* cf. l'article "Les affections du vagin, de la vulve et du périnée chez la chienne reproductrice", du même auteur, dans ce numéro.



1 Préparation de l'animal : tonte, suture en bourse de l'anus et pose d'une sonde urinaire de Foley (photo A. Gogny).

un inconfort important pour l'animal. Lorsqu'il est très prononcé, le rideau formé par le repli cutané périnéal peut aussi représenter une gêne mécanique pour l'accouplement.

- Lorsque les troubles tendent à récidiver, ou qu'ils sont réfractaires aux traitements médicaux ou deviennent chroniques, une correction chirurgicale est nécessaire [5]. Compte tenu du caractère délabrant et douloureux de l'intervention, celle-ci est à réserver aux cas où les traitements médicaux se sont avérés inefficaces.

Lorsque la périnéoplastie est envisagée, il est préférable de la réaliser lorsque l'animal a terminé sa croissance, de façon à pouvoir ajuster au mieux la portion de tissu à retirer.

## TECHNIQUE CHIRURGICALE

- La périnéoplastie (ou épisioplastie ou vulvoplastie) consiste en une exérèse du tissu cutané et du tissu adipeux sous-cutané en excès.
- Le chirurgien retire une portion de tissu en forme de croissant, dont l'épaisseur varie en fonction du degré de l'anomalie.

### 1. Préparation de l'animal

- L'animal est préparé et anesthésié de manière usuelle. L'incision cutanée et la dis-

## Objectif pédagogique

- Réaliser une périnéoplastie chez la chienne et prendre en charge les complications les plus fréquentes.

## Geste

- Geste facile, sauf pour évaluer la quantité de tissu à retirer, qui demande un peu de pratique.
- Maîtriser les bases de la biologie chirurgicale et des plasties cutanées.

## Essentiel

- Lorsque la périnéoplastie est envisagée, il est préférable de la réaliser lorsque l'animal a terminé sa croissance, pour pouvoir ajuster au mieux la portion de tissu à retirer.
- Pour la périnéoplastie, la chienne doit être positionnée en décubitus sternal.

## RUBRIQUE

- Crédit Formation Continue : 0,05 CFC par article