

## alimentation du cheval

### à la suite de coliques

Après un épisode de coliques, il est nécessaire de savoir comment et quand réalimenter un cheval.

**A** lors que la prévention des coliques par l'alimentation est un aspect souvent largement développé [4] (*encadré*), très peu de travaux sont disponibles pour savoir comment réalimenter un cheval après un épisode de coliques. La plupart des recommandations s'appuient sur les expériences et les habitudes de chacun. Pourtant, le choix des aliments et les modalités de leur distribution peuvent largement influencer la vitesse de convalescence de l'animal.

Après des recommandations générales, les modalités de reprise de l'alimentation sont détaillées, soit en suivant une colique simple, soit après un ileus important.

#### PREMIÈRES RECOMMANDATIONS

- La première recommandation pour nourrir un cheval après un épisode de colique est d'éviter soigneusement tous les aliments pouvant déclencher des coliques comme les fourrages trop fibreux ou trop riches en protéines (luzerne), l'herbe fraîche riche en azote et en sucres solubles, les concentrés riches en amidon, ... et d'éviter toutes les erreurs concernant la distribution des repas. Par exemple, le manque d'eau, le fait de donner les concentrés avant les fourrages, la distribution de grandes quantités de concentrés riches en amidon (au maximum 2 g amidon par kg PV par repas, voire 1 g d'amidon par kg PV par repas chez les chevaux "coliqueux"), les changements brutaux d'alimentation doivent être évités.

- Le vétérinaire doit vérifier l'équilibre de la ration habituellement distribuée, pour la modifier si nécessaire en fonction du motif initial de la colique.

**En pratique :** En période de crise, les précautions à prendre concernant l'alimentation sont surtout fonction de la durée de l'ileus observé, durée qui conditionne la vitesse de convalescence du cheval et les risques particuliers autour de son alimentation.

#### Encadré - Les mesures indispensables pour prévenir les coliques [4]

Afin de prévenir les coliques, il est indispensable que les chevaux aient :

- de l'eau fraîche et propre à disposition ;
- un fourrage à consommer en permanence ;
- un système de distribution du concentré propre, pas au sol surtout s'il est sableux ;
- des concentrés si cela est nécessaire, distribués après les fourrages et à teneur limitée en amidon ;
- un entretien régulier de leurs dents ;
- une vermifugation raisonnée ;
- une ration équilibrée ;
- et la possibilité de faire régulièrement de l'exercice.

#### QUELLE ALIMENTATION APRÈS UNE COLIQUE "SIMPLE" ?

- Le cheval peut être réalimenté très rapidement lorsque les coliques ont pu être prises en charge par un traitement médical dont une réhydratation adaptée.

La reprise des borborygmes est alors souvent observée dans les quatre quadrants dans les heures qui suivent.

- De l'eau doit être donnée au seau (pour pouvoir contrôler les quantités bues), à température tempérée, et parfois rationnée si le cheval se jette dessus.

- Après avoir proposé de l'eau, du foin de bonne qualité peut être distribué dans les 3 à 6 h suivant l'épisode de coliques. Les quantités de foin mises à disposition sont rationnées (débuter avec de ¼ à ½ ration divisée en cinq repas, soit des repas de 0,5 à 1 kg de foin au début) ; celles-ci permettent de surveiller que le cheval reprend de l'appétit et que sa motricité intestinale s'améliore.

- Il faut surveiller le cheval lorsqu'on enlève le panier pour qu'il ne consomme pas sa litière et veiller à ce que l'ingestion de foin soit réalisée sans précipitation. Parfois, il est utile d'utiliser des filets ou des sacs à foin ou tout autre dispositif pour contrôler la quantité ingérée et ralentir l'ingestion [5] (*photo 1*). Si tout va bien, ce foin, un foin de prairie naturel sans trop de légumineuses mais bien vert et qui sent bon, peut être ensuite distribué à volonté, dès les 48 h suivant l'épisode de colique.

Nathalie Priymenko

UP Alimentation,  
ENVT, INP-Purpan, UPS,  
F-31000 Toulouse, France

#### Objectif pédagogique

- Connaître les modalités de réalimentation après un épisode de coliques, résolu ou non par une intervention chirurgicale.

#### Essentiel

- Vérifier l'équilibre de la ration habituellement distribuée, pour la modifier si nécessaire en fonction du motif initial de la colique.

- Après un épisode de colique "simple", et après avoir proposé de l'eau, du foin de bonne qualité peut être distribué dans les 3 à 6 h suivant l'épisode de coliques.

#### RUBRIQUE

- Crédit Formation Continue : 0,05 CFC par article