

observation clinique

rechute de dermatite atopique canine

Marion Mosca

Service de dermatologie VetAgro Sup
Campus Vétérinaire de Lyon
1 avenue Bourgelat
69280 Marcy l'Etoile

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les causes de reprise du prurit chez un chien atteint de DAC sous traitement.
- Savoir les identifier lors de la consultation.
- Connaître les traitements à instaurer selon les causes.

Essentiel

- Plusieurs causes peuvent être à l'origine de démangeaisons chez un chien atteint de DAC sous traitement.
- Les plus fréquentes sont :
 - les problèmes d'observance ;
 - les complications infectieuses ;
 - le parasitisme et notamment les puces ;
 - les erreurs de diagnostic.
- Ces démangeaisons peuvent aussi n'avoir aucun rapport avec cette dermatose sous-jacente, et être due à des maladies plus rares comme le pemphigus foliacé ou le lymphome cutané T épithélioïde.

RUBRIQUE

■ **Crédit Formation Continue :**
0,05 CFC par article

démarche et traitement


Le prurit chez le chien est un motif majeur de consultation. Un animal, atteint de dermatite atopique canine, avec un traitement adapté, peut présenter une récurrence de prurit. Les causes de cette récurrence sont multiples ; il est donc important de les connaître, de savoir les identifier et les traiter.

La dermatite atopique canine (DAC) est une dermatite chronique, allergique, prurigineuse dont le traitement est complexe. Ce traitement a pour but de restaurer au mieux la barrière cutanée, de désensibiliser l'animal contre le ou les allergènes pour lequel il est sensibilisé (voire de l'éliminer si c'est possible) et, dans les formes modérées à sévères, de lutter contre l'inflammation et le prurit récidivant.

● L'animal atteint de dermatite atopique (DA) peut être stabilisé grâce à ces traitements mais il est indispensable de les prescrire au long cours, car la chronicité de la dermatite fait que l'arrêt des traitements entraîne systématiquement une récurrence. Il existe des chiens pour lesquels la DA est très bien contrôlée mais qui, malgré les traitements, présentent cependant de nouveau du prurit.

● Cet article s'intéresse aux causes possibles de prurit chez ces chiens atteints de dermatite atopique (DA) et stabilisés : d'abord, les causes les plus fréquentes de récurrences (complications infectieuses, parasitisme, défaut d'observance) et les causes plus rares (écart alimentaire, maladies intercurrentes et complications de traitement), puis la démarche à adopter face à ces cas (vérifier l'observance du traitement, rechercher les complications infectieuses et les parasites), et comment améliorer le suivi des chiens atteints de dermatite atopique pour éviter ces récurrences.

Figure 1 - Notion de seuil de prurit et de sommation des effets



LES CAUSES DE RÉCURRENCE DE PRURIT

Notion de seuil de prurit et effet de sommation

- Le prurit est un des motifs de consultation les plus fréquents chez le chien. Il correspond à une sensation naissant dans la peau et entraînant une envie de se gratter, caractérisée chez le chien, par du léchage, des mordillements ou des frottements. Selon les individus, la perception du même stimulus est ou non à l'origine de prurit, c'est ce qu'on définit comme le seuil de prurit. Un stimulus d'intensité inférieure au seuil ne déclenche pas de démangeaisons. La notion de sommation des effets est également à prendre en compte : plusieurs stimuli qui, isolés, n'entraîneraient pas de signes cliniques, voient leurs effets s'ajouter et la résultante peut être supérieure au seuil de prurit (figure 1).
- La dermatite atopique est une dermatose caractérisée par deux phases :
 - la phase de rémission, la peau est sèche, et parfois légèrement squameuse ;
 - et la phase de poussée, la peau présente des sensations de démangeaisons (érythème, suintement, croûtes sèches, papules et démangeaisons).