

conduite diagnostique face à un jetage chronique chez le chat

Julien Debeaupuits

Praticien hospitalier en médecine
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
94700 Maisons-Alfort

Objectifs pédagogiques

- ▮ Savoir explorer un jetage chronique chez le chat, et réaliser un examen clinique rigoureux.
- ▮ Comprendre et raisonner le choix et l'enchaînement des examens complémentaires.

Essentiel

- ▮ Lors de jetage chronique bilatéral qui évolue depuis plusieurs semaines, et qui rétrocede en partie, aux traitements, rechercher une affection sous-jacente.
- ▮ Les rhinites chroniques non spécifiques et les affections néoplasiques sont les deux causes les plus fréquentes de jetage chronique chez le chat.
- ▮ Penser à l'inhalation d'un corps étranger en cas de crises d'éternuements d'apparition brutale et d'évolution paroxystique associée à un jetage unilatéral.

Le jetage nasal est un signe clinique fréquent en consultation féline. Lors d'évolution chronique, (plus de 4 semaines), les rhinites chroniques non spécifiques et les tumeurs des cavités nasales sont les causes les plus fréquentes. Les rhinites bactériennes, lymphoplasmocytaires ou allergiques sont extrêmement rares dans cette espèce. Seule une démarche exhaustive et minutieuse permet d'établir le diagnostic étiologique d'un jetage chronique.

Les hypothèses infectieuses sont privilégiées lors de la présentation aiguë d'un jetage nasal chez le chat (herpèsvirus et calicivirus dans 90 p. cent des cas, parfois compliqués d'une surinfection bactérienne [10]).

En revanche, dès lors que le jetage devient chronique, d'autres hypothèses sont à envisager, en particulier les rhinites chroniques non spécifiques, les affections néoplasiques, voire les mycoses (**figure 1**). Une approche rigoureuse et hiérarchisée permet d'établir un diagnostic et de proposer un traitement adapté.


La démarche diagnostique face à un jetage chronique chez le chat s'appuie sur le recueil des éléments anamnestiques d'orientation, la réalisation d'un examen clinique approfondi et rigoureux, et sur le choix raisonné et approprié d'examens complémentaires.

RECUEIL DES COMMÉMORATIFS ET DE L'ANAMNÈSE

Commémoratifs

Les études de distribution des affections nasales en fonction de l'âge permettent de privilégier une origine néoplasique lorsque l'animal a plus de 8 ans.

Figure 1 - Origine de rhinites chroniques chez 77 chats selon une étude rétrospective
(Henderson et coll. [4])



- Chez les chats jeunes (< 8 ans), une affection congénitale ou un polype sont à rechercher [2, 4].
- Les chats qui vivent avec d'autres congénères (forte densité) sont plus sensibles aux rhinites chroniques non spécifiques (hypothétique rôle d'un agent infectieux viral) (**encadré 1**). Les animaux qui ont accès à l'extérieur sont plus exposés à des corps étrangers, à des traumatismes ou à des rhinites fongiques [5].

Anamnèse

- Si le jetage évoque essentiellement une affection nasale, il peut également s'observer lors d'atteinte paranasale, voire systémique.
- Quoique souvent visible sur l'animal, le jetage séreux peut néanmoins passer inaperçu ou être léché par l'animal. Lors d'écoulement caudal, le jetage peut être dégluti, ce qui rend tardif sa mise en évidence (exemple des tumeurs des cavités nasales, souvent à localisation caudale).
- Les renseignements sur le volume, la fréquence (jetage continu ou intermittent), la localisation (unilatéral ou bilatéral), l'apparence (séreux, muqueux, purulent, mucopurulent, sanguin, ou épistaxis pure) sont précieux.

FÉLINE

▮ Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article