prise en charge des tumeurs ano-rectales

chez le chien et le chat

Les tumeurs ano-rectales sont difficiles à traiter. Leur localisation est mal-aimée, les complications chirurgicales peuvent être redoutables, les séquelles peuvent rendre la vie impossible. Pour autant, certaines tumeurs sont d'excellent pronostic et de prise en charge chirurgicale aisée et sûre.

La prise en charge chirurgicale de ces tumeurs, peu fréquentes chez le chien et le chat, procède de la bonne démarche en cancérologie chirurgicale : le chirurgien doit reprendre avec le propriétaire l'anamnèse et l'examen clinique, connaître les maladies intercurrentes et la présence d'un éventuel syndrome paranéoplasique, s'assurer du bilan d'extension, et connaître la nature de la tumeur.

• Cette démarche permet d'exposer au propriétaire la juste place de l'exérèse chirurgicale dans la prise en charge globale de l'animal, et de l'informer du pronostic escompté. La faisabilité technique de l'intervention, son objectif (curatif, de réduction tumorale ou palliatif), ses séquelles et ses complications possibles doivent être exposés au propriétaire de l'animal qui doit être partie prenante des soins proposés.

• Après un rappel de l'anatomie chirurgicale (encadré 1, figure 1, tableau 1), une synthèse

Encadré - Anatomie chirurgicale

• La continence fécale est une des préoccupations de la chirurgie ano-rectale.

Les facteurs qui contribuent à la continence fécale sont le sphincter anal externe (SAE), son innervation et le réservoir, initialement dévolu au rectum mais qui peut être relayé par le colon descendant (figure 1, tableau 1). Le réservoir doit avoir la capacité de se distendre pour retenir les selles avant leur expulsion volontaire.

• D'autres facteurs comme la préservation du canal anal, l'intégrité de la réflexion du péritoine, donc du plexus pelvien, semblent jouer un rôle dans la continence.

1 Les tumeurs des glandes péri-anales ou glandes hépatoïdes sont des adénomes : circumanalome (Photo I. Valin).

se sur l'examen clinique, les examens complémentaires est proposée. L'article suivant décrit les techniques chirurgicales.

Objectif pédagogique

Connaître les indications de la chirurgie ano-rectale et en respecter les bonnes techniques.

Essentiel

Le rôle du toucher rectal est essentiel dans le diagnostic et l'indication de la prise en charge d'une tumeur rectale.

Les tumeurs des glandes péri-anales ou glandes hépatoïdes sont des adénomes (circumanalome) ou des adénocarcinomes.

Figure 1 - Anatomie, topographie des muscles de la région recto-anele (d'après [5])

CANINE - FÉLINE

Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article