les œsophagites et les sténoses œsophagiennes chez le chien

Dominique Blanchot

Clinique Vétérinaire Occitanie
185 Avenue des États-Unis
31200 Toulouse

Objectifs pédagogiques

Reconnaître les signes cliniques d'appel d'une œsophagite ou d'une sténose œsophagienne.

Connaître les éléments du diagnostic des œsophagites et des sténoses œsophagiennes.

Connaître les principes de traitement des œsophagites et des sténoses œsophagiennes chez le chien et le chat.

Signes cliniques d'appel

Les signes cliniques d'appel d'une œsophagite ou d'une sténose œsophagienne sont les symptômes d'une dysphagie œsophagienne avec la présence de régurgitations plus ou moins importantes.

diagnostic, traitement et prévention

Les signes cliniques, les moyens de traitement des œsophagites et des sténoses œsophagiennes sont présentés dans cet article.

L'œsophagite est une inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse œsophagienne pouvant atteindre parfois les couches plus profondes (*muscularis mucosae* et sous-muqueuse).

Les sténoses œsophagiennes sont caractérisées par un rétrécissement pathologique de la lumière de l'œsophage et peuvent être, entre autres, la conséquence d'œsophagites non traitées.

Cet article propose une synthèse des principales causes d'œsophagites et de sténoses œsophagiennes. Les symptômes ainsi que les moyens de diagnostic et les traitements sont abordés.

LES ŒSOPHAGITES

Étiologie

- L'inflammation de l'œsophage peut être la conséquence d'un certain nombre d'affections et peut survenir à tout âge :
 - reflux gastro-œsophagien ;
 - corps étrangers ;
 - ingestion de produits caustiques ;
 - brûlures thermiques ;
 - ingestion de médicaments (doxycycline, clindamycine) ;
 - agents infectieux (rare) (*figure 1*).
- Les causes infectieuses sont rares chez l'animal et surviennent essentiellement chez des sujets immunodéprimés.
- Chez le chat, le calicivirus, l'herpès virus, les coronavirus ont été mis en cause.
- Les œsophagites sont plus fréquentes chez le chien que chez le chat. Dans cette espèce, certains médicaments comme les tétracyclines et la clindamycine sont mis en cause dans l'apparition d'œsophagites parfois sévères dans cette dernière espèce [2, 8].
- Toutefois, les œsophagites les plus souvent observées sont liées à un traumatisme local :

Figure 1 - Principales causes d'œsophagite

1	Le reflux gastro-œsophagien
2	Les corps étrangers
3	L'ingestion de produits caustiques
4	Les brûlures thermiques
5	L'ingestion de médicaments (doxycycline, clindamycine)
6	Les agents infectieux (rare)

1 Œsophagite post-traumatique suite à l'ingestion d'un os chez un Westie de 9 ans (photo D. Blanchot).

ingestion de produits caustiques, présence prolongée de corps étranger (*photo 1*), ingestion de substances chaudes et surtout, présence de reflux gastro-œsophagiens trop fréquents [5]. Ces reflux s'observent à la suite d'une anesthésie générale par diminution du tonus du sphincter œsophagien caudal (barbituriques) [1], de la présence d'une hernie hiatale et lors de syndrome obstructif des brachycéphales (*photo 2*).

Clinique

- Les symptômes sont souvent discrets et peu caractéristiques : toux d'origine indéterminée, hypersalivation, régurgitations de liquide le matin ou à la suite d'un effort physique, dysorexie et postures traduisant une douleur ou un inconfort.
- Lors de lésions plus importantes, un syndrome dysphagique apparaît avec régurgitations, anorexie, déglutitions

CANINE - FÉLINE

Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article