conduite à tenir face à une diarrhée chronique

Alexane Bèche Marine Hugonnard

Unité Médecine Interne des Animaux de Compagnie. Université de Lyon VetAgro Sup 69280 Marcy l'Étoile

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la démarche diagnostique face à une diarrhée chronique.
- Connaître les indications et les limites des différents examens complémentaires.
- Comprendre la place des essais de traitement dans la démarche diagnostique.

Clinique

- Une diarrhée du grêle se caractérise par des selles molles et volumineuses associées à une fréquence de défécation normale à modérément augmentée.
- Celles-ci peuvent s'accompagner de répercussions systémiques : altération de l'appétit, de la vitalité, perte de poids.
- Une diarrhée du côlon s'exprime typiquement par des selles liquides émises très fréquemment avec un volume fécal diminué et une urgence à la défécation.


CANINE - FÉLINE

Crédit Formation Continue : 0,05 CFC par article

de l'intestin grêle

chez le chien et le chat

Confronté à une diarrhée chronique du chien ou du chat, une démarche diagnostique réfléchie et rigoureuse est nécessaire.
Celle-ci repose à la fois sur les signes cliniques, des examens complémentaires ciblés, et la réponse aux essais de traitement lorsqu'ils sont compatibles avec l'état clinique de l'animal.



• Il convient tout d'abord d'identifier la zone atteinte (grêle ou côlon) et d'évaluer la gravité de l'affection en fonction des répercussions systémiques éventuelles.

Les examens complémentaires disponibles pour explorer plus spécifiquement les causes de diarrhée du grêle sont nombreux (coproscopie, biologie sanguine, échographie, endoscopie). Leur utilisation doit être justifiée et ordonnée afin de garantir la pertinence de la démarche diagnostique.

Les essais de traitement tiennent une place non négligeable dans cette démarche pour les diarrhées du grêle dénuées de caractère de gravité.

• Après un rappel des critères distinctifs d'une diarrhée du grêle et d'une diarrhée du côlon, l'utilisation raisonnée des examens complémentaires et les traitements à mettre en œuvre lors de diarrhée du grêle sont présentés.

LA DIARRHÉE CHRONIQUE

• Caractériser la diarrhée et localiser l'atteinte à l'intestin grêle ou au côlon est le premier temps de la démarche diagnostique face à une diarrhée chronique.



Image échographique d'une coupe longitudinale d'intestin grêle d'un chat présentant une entéropathie chronique.

- Noter l'épaississement de la musculeuse (photos Campus vétérinaire de Lyon).

• Ceci nécessite d'évaluer l'aspect des selles, le comportement d'exonération, et les signes généraux associés (tableau 1, figure).

Chez le chien

- Une diarrhée du grêle se caractérise par des selles molles et volumineuses associées à une fréquence de défécation normale à modérément augmentée, pouvant s'accompagner de répercussions systémiques (altération de l'appétit, de la vitalité, perte de poids).
- Une diarrhée du côlon s'exprime typiquement par des selles liquides émises très fréquemment avec un volume fécal diminué et une urgence à la défécation. Une malpropreté fécale, du ténesme, ou la présence de mucus peuvent être associés à une diarrhée du côlon, l'état général est généralement peu ou pas altéré, et il n'y a pas de perte de poids associée.
- Des vomissements peuvent être observés à la fois lors de diarrhée du grêle ou du côlon. Une attention particulière doit être portée à l'hémochésie, signe d'appel fort d'une diarrhée du côlon.

Cependant, ce signe peut être également observé lors de diarrhée du grêle si les saignements sont importants et associés à un transit accéléré, empêchant la digestion du sang (parvovirose, corps étranger contendant).

→ Tous les éléments typiques d'une diarrhée du grêle ou du côlon ne sont que rarement réunis et il convient de raisonner en proportions relatives des différents critères