

# les anomalies de la phase oro-pharyngée

## chez le chien et le chat

Julien Debeaupuits  
Laurent Gouardo  
Édouard Aletti

Clinique vétérinaire SOYVET  
42, route de Chartres  
78190 Trappes

Les dysphagies sont des affections fréquentes chez le chien, plus rares chez le chat. Les causes en sont très variées : corps étranger, sténose, tumeur, ... La régurgitation est la manifestation clinique la plus fréquente. Les dysphagies sont classées selon la phase de la déglutition qui est atteinte. La radiographie est un examen de choix pour évaluer la principale complication, la bronchopneumonie. Une vidéofluoroscopie peut se révéler nécessaire pour établir le diagnostic d'une dysphagie (en particulier lors d'atteinte cricopharyngée).



1 Chiot avec retard de croissance et cachexie souffrant d'achalasie cricopharyngée (photo J. Debeaupuits).

Après avoir présenté les grandes phases de la déglutition, nous abordons les affections pouvant atteindre cette phase et proposons une démarche diagnostique en trois temps. Tout d'abord, il s'agit de caractériser la dysphagie, en s'appuyant sur l'anamnèse et un examen clinique rigoureux. Ensuite, il convient de rechercher la cause de la dysphagie en réalisant des examens complémentaires. Enfin, il s'agit de rechercher les éventuelles complications.

### LE BILAN ANAMNESTICO-CLINIQUE, LORS DE DYSPHAGIE ORO-PHARYNGÉE


- Le contexte d'apparition et d'évolution des régurgitations est une donnée majeure : apparition à la naissance, aggravation après le sevrage, difficultés à la déglutition, absence de modification du comportement alimentaire, régurgitation immédiate, retard de croissance, ...
- L'anamnèse est essentielle pour l'exploration d'une dysphagie [3]. En effet, les signes cliniques ne sont habituellement pas observés lors de l'examen clinique et il est

### Objectifs pédagogiques

- Établir une démarche diagnostique lors de dysphagies concernant la phase oro-pharyngée de la déglutition.
- Connaître les principales hypothèses lors de dysphagie oro-pharyngée.
- Connaître les différences sémiologiques et cliniques entre régurgitations et vomissements.

La dysphagie est un terme non spécifique caractérisant une anomalie de la déglutition. On considère l'origine d'une dysphagie en prenant en compte la phase de la déglutition qui est atteinte. Ainsi, les dysphagies peuvent être d'origine oropharyngée, œsophagienne ou gastro-œsophagienne [4, 12] (photo 1). Cet article s'intéresse exclusivement aux anomalies de la phase oro-pharyngée (figure 1). Son objectif est de présenter les notions de dysphagies et de régurgitations en se focalisant sur les anomalies de la phase oro-pharyngée (encadré 1).

Figure 1 - Diagramme présentant les différentes structures impliquées dans le processus de déglutition lors de la phase oro-pharyngée [d'après 10]



### Essentiel

- Les dysphagies peuvent être d'origine oropharyngée, œsophagienne ou gastro-œsophagienne.
- La régurgitation est une des manifestations cliniques de la dysphagie.

CANINE - FÉLINE

Crédit Formation Continue :  
0,05 CFC par article