comment diagnostiquer et traiter les états kératoséborrhéiques généralisés, sans prurit

chez le chien adulte

En cas d'état kératoséborrhéique généralisé sans prurit, chez le chien adulte, des maladies systémiques sont à rechercher, en particulier la leishmaniose. En présence de signes généraux, les dysendocrinies et certaines formes de lupus érythémateux font également partie du diagnostic différentiel. Lorsqu'il n'existe pas de manifestation extra-cutanée, il convient d'envisager une adénite sébacée granulomateuse ou, plus rarement, une dermatose lichénoïde.

Les états kératoséborrhéiques (EKS) se traduisent par la présence de pellicules ou de squames, aux caractéristiques variables, et d'une séborrhée, sèche ou grasse. Ils peuvent être associés ou non à un prurit et être localisés ou généralisés (tableau 1).

- Lors d'EKS généralisé non prurigineux chez un chien adulte, des signes généraux sont tout d'abord à rechercher avec le recueil de l'anamnèse et l'examen clinique, afin d'orienter le diagnostic.

- La leishmaniose doit être systématiquement évoquée lors d'atteinte marquée de l'état général, en particulier si celle-ci est associée à des atteintes extra-cutanées, articulaires, rénales ou hématologiques.

- Le principal diagnostic différentiel est un lupus érythémateux, dont il existe différentes formes, certaines strictement cutanées et d'autres systémiques qui peuvent s'accompagner de lésions cutanées (encadré 1).

- Les dysendocrinies les plus fréquemment rencontrées chez le chien (hypothyroïdie, hypercorticisme et dysendocrinies sexuelles) sont également responsables de l'apparition d'un EKS généralisé non prurigineux chez le chien adulte et d'atteintes extra-

Encadré 1 - Classification des formes de lupus érythémateux chez le chien

- La classification des différentes formes de lupus est complexe. Il existe des formes strictement cutanées et des formes systémiques (lupus érythémateux systémique) pouvant s'accompagner de lésions cutanées.
- Plusieurs formes à traduction cutanée existent :
 - le lupus érythémateux cutané (autrefois dénommé lupus discoïde) : il se manifeste par une atteinte localisée le plus fréquemment (face principalement). Il existe quelques descriptions d'atteinte généralisée [12] ;
 - le lupus érythémateux cutané vésiculeux : il se caractérise par des vésicules, des bulles et des ulcères sur l'abdomen des Colleys et des Shetlands ;
 - le lupus érythémateux cutané exfoliatif est une dermatite exfoliative généralisée chez les jeunes Braque allemand.

cutanées. Cependant, contrairement aux précédentes hypothèses, l'état général est souvent moins sévèrement altéré et une alopecie bilatérale symétrique non inflammatoire accompagne l'EKS.

- En l'absence de signe extra-cutané, le clinicien évoque, en priorité, une adénite sébacée granulomateuse (ASG). Il s'agit d'une dermatose rare due à la destruction des glandes sébacées dont la pathogénie est inconnue.

- Plus rarement, une dermatose lichénoïde pourra être en cause (encadré 2).

Cet article expose la démarche diagnostique face à un état kératoséborrhéique (EKS) généralisé non prurigineux chez le chien adulte. Le but est d'identifier la dermatose en cause et de mettre en place un traitement spécifique lorsque celui-ci existe.

RECUEIL DES COMMÉMORATIFS ET DE L'ANAMNÈSE

- Les éléments épidémiologiques peuvent permettre de s'orienter et doivent donc être recueillis avec précision.

Le lieu de vie de l'animal

- La leishmaniose, qui doit être systématiquement envisagée lors d'état kératoséborrhéique (EKS), est une maladie qui concerne les chiens vivant, ou ayant séjourné, en

Émilie Vidémont-Drevon

Dip ECVD

CHVSM

Unité de Dermatologie,
74370 Saint Martin Bellevue

Objectifs pédagogiques

- Connaître les maladies responsables d'un état kératoséborrhéique généralisé sans prurit chez le chien adulte.

- Savoir comment les diagnostiquer et les traiter.

Essentiel

- Hypercorticisme, hypothyroïdie et dysendocrinies sexuelles sont, le plus souvent, responsables d'un état kératoséborrhéiques (EKS) généralisé, associé à une alopecie bilatérale symétrique, non inflammatoire et non prurigineuse.

- Une leishmaniose et un lupus érythémateux sont à évoquer, en présence d'un EKS généralisé non prurigineux qui s'accompagne d'une altération de l'état général.

CANINE - FÉLINE

■ Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article