

diagnostic et traitement des affections du sac anal

Jérémy Béguin
Ghita Benchekroun

Service de Médecine Interne,
École Nationale Vétérinaire
7 avenue du général de Gaulle
94700 Maisons Alfort.

Objectifs pédagogiques

- Mener une démarche diagnostique face à la présence d'une masse du sac anal.
- Expliquer la prise en charge thérapeutique d'un adénocarcinome des glandes apocrines du sac anal.
- Citer les facteurs pronostiques d'un adénocarcinome des glandes apocrines du sac anal.
- Prendre en charge une sacculite et un abcès des sacs anaux.

Essentiel


- Le traitement des affections inflammatoires des sacs anaux comprend des traitements locaux et systémiques.
- Une prise en charge chirurgicale est indiquée, lors de sacculites chroniques, d'obstructions récidivantes, ou d'abcès.

chez le chien et le chat

Les affections des sacs anaux sont fréquentes en pratique quotidienne ; elles représentent environ 12 p. cent des motifs de consultations chez le chien [8]. Il est donc important de savoir les diagnostiquer, et les prendre en charge. Parmi les affections les plus fréquentes figurent les sacculites, les obstructions, les inflammations, les abcès, les fistules, et les tumeurs telles que l'adénocarcinome des glandes apocrines des sacs anaux (AGASA).

Les sacs anaux sont deux diverticules en marge de l'anus, situés entre le sphincter interne et externe, qui s'abouchent latéralement à l'orifice anal, en regard de la jonction cutané-anale, à 4 et 8 h respectivement (figure 1). Leur environnement anatomique, est constitué de muscles (muscle sphincter anal interne et externe, et muscle élévateur de l'anus), de nerfs (rectaux caudaux, honteux, ainsi que plus à distance, les nerfs glutéaux et sciatiques), et de vaisseaux (artères honteuses et fessières) (figure 2). Il est essentiel de bien connaître ces

Figure 1 - Position des sacs anaux à 4 h et 8 h (coupe transverse)




détails anatomiques afin de prévenir toute complication chirurgicale.

- Les sacs contiennent des glandes apocrines et sébacées qui peuvent être principalement le siège d'affections tumorales ou inflammatoires.
- Dans cet article, nous abordons le diagnostic et le traitement des affections inflammatoires et tumorales des sacs anaux.

LES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DES SACS ANAUX

- Les affections inflammatoires du sac anal sont fréquentes chez le chien, en particulier chez le Labrador retriever et le cavalier King Charles, mais rares chez le chat.

Figure 2 - Environnement anatomique des glandes apocrines



CANINE - FÉLINE

■ Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article