

conduites à tenir face à un corps étranger œsophagien

chez le chien

Les corps étrangers œsophagiens sont une urgence médicale.

La majorité des corps étrangers peuvent être retirés sous contrôle endoscopique, sans complication sérieuse associée.

Des complications telles que perforation œsophagienne, pyothorax, ... sont toutefois possibles et doivent être anticipées.

Un corps étranger œsophagien nécessite une prise en charge immédiate [5, 8, 10, 11]. En effet, plus le corps étranger persiste dans l'œsophage, plus le risque de pneumonie par aspiration et de lésions pariétales œsophagiennes augmente.

- Les corps étrangers de nature osseuse constituent de loin la majorité des corps étrangers œsophagiens (47 à 100 p. cent des cas selon les études). Les autres types de corps étrangers retrouvés sont des os à mâcher en peau de buffle, des hameçons, des morceaux de plastique, des aiguilles (particulièrement chez les chatons et chez des jeunes chats), des corps étrangers linéaires (chat), des balles, des jouets, etc.

- La localisation préférentielle des corps étrangers correspond à trois zones de rétrécissement anatomique naturel de l'œsophage : l'entrée du thorax, la base du cœur et la région juste en amont du sphincter œsophagien caudal.

La plupart des corps étrangers, soit trop grands pour passer, soit tranchants/coupants ou pointus, restent bloqués à ces endroits critiques.

Les corps étrangers lisses ou arrondis ont tendance à passer spontanément dans l'estomac, sauf en cas de dysmotilité œsophagienne ou lors de zone de rétrécissement pathologique (par exemple : sténose bénigne, néoplasie).

- Le retrait sous endoscopie est la technique de choix. Parmi les techniques de retrait de corps étrangers œsophagiens décrites. Le taux de réussite est excellent et la plupart des lésions pariétales œsophagi-

ennes, associées au corps étranger et son retrait, guérissent sans complications. Toutefois, des complications sévères, voire fatales, peuvent survenir.

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

- Les corps étrangers œsophagiens sont une cause fréquente de dysphagie et de régurgitation chez le chien ; ils sont plus rares chez le chat en raison d'un comportement alimentaire différent [2, 5, 7, 11].
- Chez les chiens, les Terriers, plus particulièrement les West Highland White terriers, sont prédisposés [3, 5, 6, 10]. Toutes les tranches d'âge peuvent être représentées*.

ANAMNÈSE, SIGNES CLINIQUES ET COMPLICATIONS ASSOCIÉES

Recueil de l'anamnèse

- Le recueil de l'anamnèse avec les propriétaires permet souvent de suspecter le corps étranger si ceux-ci ont pu observer ou suspecter son ingestion [7, 11]. Ce dialogue permet également de connaître le type de corps étranger ingéré et le moment de l'ingestion. Mais la difficulté résulte surtout de la capacité du clinicien de suspecter cette hypothèse lorsque le propriétaire ne rapporte pas l'ingestion d'un corps étranger. Les signes cliniques sont en effet peu spécifiques.
- Exceptionnellement, certains corps étrangers œsophagiens cervicaux peuvent être palpés en région jugulaire gauche.

Signes cliniques

- Les signes cliniques sont plus ou moins sévères selon le type et la taille du corps étranger, sa localisation, la durée de l'obstruction et la présence de complications [2, 5, 8, 10, 11]. Les lésions pariétales œsophagiennes sont induites par la pression directe qu'exerce le corps étranger sur la paroi œsophagienne ainsi que par l'augmentation du péristaltisme secondaire à la présence du corps étranger.

NOTE

* La raison de cette prédisposition n'est pas claire. Il pourrait s'agir d'une différence anatomique ou comportementale par rapport aux autres races.

Alexandra Gabriel¹
Anaïs Lamoureux²

¹ dipl. ECVIM-CA
Spécialiste en médecine interne
² CHV Pommery
Service de médecine interne
226 Boulevard Pommery
51100 Reims

Objectifs pédagogiques

- Connaître l'épidémiologie, les signes cliniques, les examens complémentaires, les méthodes d'extraction et les complications possibles lors de corps étrangers œsophagiens.
- Comprendre pourquoi le corps étranger œsophagien est une urgence médicale.

Essentiel

- Les Terriers, plus particulièrement le West Highland White terrier, sont prédisposés aux corps étrangers œsophagiens.

CANINE - FÉLINE

■ **Crédit Formation Continue :**
0,05 CFC par article