le mégaoesophage

conduite à tenir diagnostique et thérapeutique chez le chien et le chat

Virginie Fabrès¹
Rachel Lavoué²

¹ Service de Médecine Interne
École Nationale Vétérinaire d'Alfort
7, avenue du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort

² Service de Médecine Interne
École Nationale Vétérinaire de Toulouse
(INP-ENVT)
23, chemin des Capelles
31076 Toulouse Cedex 3

Objectifs pédagogiques

▮ Savoir reconnaître les signes cliniques et radiographiques d'un mégaoesophage.

▮ Connaître les différentes causes et les complications du mégaoesophage afin de les rechercher et d'informer le propriétaire du pronostic.

▮ Pouvoir mettre en œuvre les principales mesures hygiéniques palliatives.

Définition

▮ Diverticule œsophagien : dilatation cavitaire de la paroi formant une hernie de la muqueuse.

Essentiel

▮ Le mégaoesophage se manifeste cliniquement par la présence de régurgitations.

Le mégaoesophage est une affection plus fréquente chez le chien que chez le chat. Une anamnèse complète ainsi que des radiographies thoraciques sans préparation permettent en général de l'identifier.

Toutefois, le diagnostic étiologique du mégaoesophage nécessite une démarche diagnostique rigoureuse afin de rechercher une cause sous-jacente.

Si aucune affection sous-jacente n'est identifiée, l'essentiel du traitement repose sur des mesures hygiéniques.

Celles-ci limitent les complications du mégaoesophage qui diminuent l'espérance de vie des animaux.

Le mégaoesophage se définit par la présence d'une dilatation de l'œsophage sur toute sa longueur ; celle-ci survient suite à un déficit de motilité œsophagienne [9, 10]. Cette affection se différencie du jabot ou des diverticules œsophagiens (*définition*) qui se caractérisent par une dilatation focale de l'œsophage.

• Le mégaoesophage peut être congénital ou acquis. La forme acquise apparaît chez l'adulte, et peut être idiopathique (forme la plus courante), ou secondaire à une affection sous-jacente.

• Lors de la suspicion clinique de mégaoesophage, il convient ensuite de l'identifier, puis de rechercher une affection sous-jacente. En effet, la prise en charge thérapeutique et le pronostic dépendent en partie de la présence d'une cause identifiable à l'origine du mégaoesophage.

1 Radiographie de thorax de chien atteint d'un mégaoesophage. Les flèches montrent les bords ventral et dorsal de l'œsophage dilaté par de l'air (photo service d'imagerie de l'ENV Alfort).

QUAND SUSPECTER UN MEGAOESOPHAGE ?

• Le mégaoesophage se manifeste cliniquement par la présence de régurgitations [9, 10, 13]. Leur fréquence et le moment d'apparition par rapport au repas sont variables. Les régurgitations sont le plus souvent post-prandiales, mais peuvent être différées par rapport à la prise alimentaire. Lors de régurgitations décalées des repas, la confusion avec des vomissements est fréquente.

De plus, la présence de mouvements abdominaux peut parfois être visualisée lors de la remontée du bol alimentaire dans l'œsophage, ce qui complique l'identification par le propriétaire de l'animal. Aussi, est-il nécessaire d'interroger celui-ci très précisément afin d'exclure la présence de prodromes évocateurs de vomissements (mâchonnement, salivation) et d'efforts abdominaux expulsifs répétés, associés au rejet d'aliments (*tableau 1*).

• Le tableau clinique peut également inclure un amaigrissement malgré un appétit conservé à augmenté, du ptyalisme et des troubles respiratoires, reflets des complications que le mégaoesophage entraîne : déficit énergétique, présence d'une œsophagite ou d'une bronchopneumonie par aspiration. Lors d'atteinte neuro-

CANINE - FÉLINE

▮ Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article