

revue internationale

les articles parus classés par thème dans les revues



- <i>Veterinary Ophthalmology</i>	2011;14(4):244-7
- <i>Journal of Veterinary Internal Medicine</i>	2011;25(5):1113-7, 1118-26
- <i>Veterinary Surgery</i>	2011;40:708-14
- <i>Veterinary Radiology and Ultrasound</i>	2011;10.
- <i>Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA)</i>	2011;238(12):1634-8 ; 2011;239(6):842-9
- <i>Equine Veterinary Journal</i>	2011;18 ; 2011;44(2):238-43 ; 2011;43(4):424-29 ; 2012;44(2):214-20

rubrique dirigée

par Jean-Luc Cadore¹

Jean-Philippe Germain²

¹ Pôle équin

VetAgro-Sup, 1, avenue Bourgelat
BP 83, 69280 Marcy-l'Étoile

² La clinique du cheval

3910, Route de Launac
31330 Grenade

Cancérologie

- **Traitement efficace des sarcoïdes équinés par électrochimiothérapie à base de cisplatine :**

étude rétrospective de 48 cas

Imagerie

- **Obtention de liquide**

céphalo-rachidien sur cheval debout par ponction échoguidée de la région cervicale

- **Réssection partielle de paroi guidée par tomographie ou par imagerie par résonance magnétique** pour l'exérèse des kératomes

- **Évaluation endoscopique de la bourse naviculaire :** observations, traitements et devenir de 92 cas dont l'affection est identifiée

Locomoteur

- **Concentration en D-Dimère dans le liquide synovial** chez les poulains atteints d'arthrite septique

Ophtalmologie

- **Phacoémulsification et implantation de lentilles intra-oculaires flexibles de 14 Dioptrie (D)** chez cinq chevaux adultes

Pharmacologie

- **Toxicité du clenbutérol après administration d'un produit composé**

chez trois Quarter Horse de course

- **Utilisation du bromure de rocuronium dans le bloc neuromusculaire** pour la chirurgie oculaire chez le cheval

Respiratoire

- **Les anomalies épiglottiques** chez les chevaux adultes autres que ceux de course : 23 cas (1990-2009)

- **Estimation endoscopique de l'inflammation des voies aériennes** chez le cheval

Reproduction

- **Induction de la maturation fœtale et de la mise-bas** suite à un traitement à base de dexaméthasone chez des juments en fin de gestation

Synthèses rédigées par

Nicolas Dauphin, Philippe Gay,

Marie Lejeune, Élodie Lenoir,

Amandine Prach, Pierre-Charles Quittet,

Maria Simondon, Gaspard Tronel, Sara Uvodic

un panorama des meilleurs articles d'équine

LES ANOMALIES ÉPIGLOTTIQUES chez les chevaux adultes autres que ceux de course : 23 cas (1990-2009)

- Les principales anomalies épiglottiques sont l'accrochement ary-épiglottique, l'hypoplasie épiglottique, les kystes et les granulomes sous-épiglottique, l'épiglottite et les abcès dorsaux de l'épiglotte.
- Chez les chevaux de course, les principaux symptômes liés aux anomalies épiglottiques sont le cornage et l'intolérance à l'effort plutôt que la toux et le jetage nasal.

Sujet, matériels et méthodes

- Les critères d'inclusion ont été remplis pour 23 chevaux adultes (> 8 ans) qui présentaient une anomalie épiglottique diagnostiquée par endoscopie.
- Les dossiers médicaux ont été examinés rétrospectivement afin de collecter l'ensemble des données.

Résultats

- Une toux chronique a été le motif de consultation de 16 chevaux (70 p. cent).
- Parmi les anomalies épiglottiques, 13 chevaux ont présenté un accrochement ary-épiglottique, sept un granulome sous-épiglottique et trois, un

kyste sous-épiglottique.

- Tous les chevaux ont été traités chirurgicalement.
- Les signes cliniques ont été résolus chez 17 chevaux (74 p. cent). Un traitement médical prolongé, suite à l'inflammation sous-épiglottique post-opératoire, a été nécessaire pour quatre d'entre eux.
- Sur les six chevaux n'ayant pas eu de résolution complète des symptômes, quatre ont présenté des signes d'obstruction récurrente des voies respiratoires et deux ont développé un déplacement dorsal du voile du palais permanent.

Conclusion

- La toux est un symptôme couramment observé lors d'anomalie épiglottique chez les chevaux adultes, autres que ceux de course.
- L'endoscopie des voies respiratoires supérieures est indiquée dans l'investigation d'une toux chronique.
- Le traitement chirurgical des anomalies épiglottiques est efficace dans la plupart des cas. Un traitement médical post-opératoire prolongé est parfois nécessaire.



Respiratoire

Objectif de l'étude

■ Identifier l'anamnèse, les signes cliniques, les résultats des endoscopies des voies respiratoires supérieures, les traitements et leurs résultats chez des chevaux adultes autres que ceux de course présentant des anomalies épiglottiques.

► *Journal of the American Veterinary Medical Association* 2011;238(12):1634-8.

Epiglottic abnormalities in mature non racehorses : 23 cases (1990-2009).
Aitken MR, Parente EJ.

Synthèse par Gaspard Tronel,
VetAgro Sup
campus vétérinaire de Lyon

REVUE INTERNATIONALE