

diagnostic et traitement de la furonculose anale

chez le chien

Véronique Viateau

DMV, PhD
Service de Chirurgie,
ENVA

7 avenue du général de Gaulle
94700 Maisons Alfort.,

La furonculose anale (ou fistules périanales) constitue l'une des affections les plus fréquentes de la région péri-anale. Cette affection, responsable d'une diminution sensible de la qualité de vie en l'absence d'une prise en charge adaptée, doit être diagnostiquée et traitée le plus précocement possible. Naguère, un véritable défi thérapeutique, cette affection conduit désormais à la guérison des animaux dans plus de 95 p. cent des cas.

La furonculose anale est une inflammation chronique et évolutive de la région péri-anale qui impacte de façon importante la qualité de vie des animaux atteints. Elle affecte principalement le Berger allemand qui représente 85 p. cent des animaux atteints, et est aussi rapportée dans de nombreuses races comme le Golden Retriever, le Colley, les Épagneuls, le Bouledogue Anglais, le Setter Irlandais ainsi que chez des chiens issus de croisements.

• Cette affection douloureuse survient le plus souvent chez des adultes âgés de 4 à 7 ans en moyenne.

• L'intervention chirurgicale a longtemps été considérée comme le traitement de référence, avec néanmoins parfois des complications majeures invalidantes (sténoses anales, incontinence fécale). Elle conduit dans certaines études à l'euthanasie dans 6 à 41 p. cent des cas [9, 16, 23].

• La mise en évidence d'un dysfonctionnement immunitaire chez les animaux atteints a profondément modifié le traitement de cette affection et son pronostic.

Un diagnostic précoce, une bonne connaissance de l'anatomie de la région péri-anale, des éléments connus de l'étiologie, de la pathogénie et de la physiopathologie de cette affection, des intérêts et des limites

des traitements immunosuppresseurs et chirurgicaux sont des prérequis indispensables pour avoir toutes les chances de guérison.

ÉTIOLOGIE, PATHOGÉNIE, PHYSIOPATHOLOGIE, LÉSIONS

• Si une prédisposition génétique chez le Berger allemand est probable (85 p. cent des animaux atteints), et la présence d'un dysfonctionnement immunitaire chez les chiens atteints est avérée, de nombreux facteurs prédisposant ou aggravants, avérés ou supposés, entrent en compte dans la survenue et l'évolution de la maladie (*tableau 1*).

• L'étiologie et la pathogénie de cette affection, qui présente des analogies avec la maladie de Crohn chez l'homme, restent ainsi mal connues [19].

• Le tableau lésionnel est dominé par une folliculite, une furonculose, une hydro-sadénite suppurée, une adénite sébacée et circumanale, et une infiltration lymphoplasmo-cytaire pérисudorale [6].

• L'atteinte des sacs anaux n'est pas systématique et elle est considérée le plus souvent comme secondaire. Néanmoins, de nombreuses études rapportent une guérison après retrait des sacs anaux lors d'échec du traitement immunosuppresseur suggérant leur importance dans l'évolution de la maladie [13, 15, 19, 21].

SYMPTÔMES

• Un amaigrissement, un abattement peuvent être présents. Les troubles fonctionnels sont dominés par la douleur, une dyschésie, un ténesme, un prurit anal associé à un léchage, une constipation auxquels peuvent être associés de la diarrhée, en particulier chez les chiens atteints d'une colite chronique.

• Les ulcérations péri-anales, plus ou moins étendues et profondes (le plus souvent sans rapport avec les sacs anaux en début d'évolution), souvent surinfectées et malodorantes, atteignent tout ou une partie des régions cutanées et sous-cutanées péri-anales. C'est sur cette répartition qu'est fondée leur classification (stades 1 à 4 selon qu'elles affectent le quart à la totalité de la

Objectifs pédagogiques

■ Adapter la stratégie de prise en charge thérapeutique en tenant compte de l'animal et du contexte, et la justifier.

■ Chiffrer le coût approximatif d'une prise en charge médico-chirurgicale.

■ Choisir un traitement immunosuppresseur dans le cadre de la prise en charge d'une furonculose anale.

■ Décrire les objectifs et les principes du traitement chirurgical de la furonculose anale.

En pratique

■ Grâce à une prise en charge médico-chirurgicale individualisée, la furonculose anale conduit désormais à la guérison des animaux dans plus de 95 p. cent des cas.

CANINE - FÉLINE

■ Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article